



**Инструкция  
по медицинскому применению лекарственного средства  
(информация для специалистов)**

**ПЕРМЕТРИН**

**Торговое название**

Перметрин

**Международное непатентованное название**

Permethrin

**Форма выпуска**

Спрей для наружного применения 5 мг/г

**Состав**

Один баллон (50 г) содержит:

*активное вещество:* перметрин – 250 мг;

*вспомогательные вещества:* этоний, бензалкония хлорид, этанол (96 %), вода очищенная.

**Описание**

Прозрачная жидкость бесцветная или слабо желтого цвета с характерным спиртовым запахом.

**Фармакотерапевтическая группа**

Средства для уничтожения эктопаразитов, включая средства против чесоточного клеща, инсектициды и репеленты. Пиретрины, включая синтетические соединения

**Код АТС:** P03AC04

**Фармакологические свойства**

**Фармакодинамика**

Инсектицидное средство контактного действия, которое относится к группе синтетических пиретроидов. Оказывает педикулицидное действие, пагубно влияет на гниды, личинки и половозрелые формы головных и лобковых вшей. Нарушает проницаемость натриевых каналов мембран нервных клеток насекомых, тормозит процесс реполяризации нервной клетки, что приводит к парализующему эффекту.

**Фармакокинетика**

После кожной аппликации абсорбция составляет не более 2 %. Часть вещества, попадающего в системный кровоток быстро гидролизуется до неактивных метаболитов, экскретируется исключительно почками.

**Показания для применения**

Педикулез (головной, лобковый).

**Способы применения и дозировка**

Наружно. Перед применением препарата волосы следует вымыть и просушить полотенцем. Нажимают на головку распылителя и распыляют лекарственное средство на волосы, втирая его в корни волос. При распылении лекарственного средства конец распылителя необходимо держать на расстоянии 3 см от волос.

После обработки лекарственное средство оставляют на волосах на 10-40 минут (голову можно накрыть платком), затем тщательно смывают теплой проточной водой и высушивают обычным способом. После мытья волосы расчесывают густым гребешком для удаления погибших паразитов; при обнаружении живых вшей обработку повторяют через 7 дней.

Для достижения оптимального эффекта в течение 3-х дней после применения препарата не рекомендуется мыть волосы с использованием моющего средства (шампуня), мытье водой допускается.

Расход лекарственного средства в зависимости от густоты и длины волос – от 10 мл до 60 мл.

При лобковом педикулезе спрей распыляют короткими нажатиями на головку распылителя до полного покрытия всей волосистой части лобковой зоны.

Через 30 минут обработанные участки тщательно промывают водой.

### **Побочное действие**

В отдельных случаях возможны:

*Аллергические реакции:* кожные высыпания и отечность.

*Местные реакции:* ощущение жжения, покалывания или пощипывания, онемения кожи, усиление зуда, эритема.

*Со стороны нервной системы:* головные боли, парестезия, головокружение.

*Со стороны дыхательной системы:* затрудненное дыхание.

*со стороны пищеварительной системы:* тошнота, рвота.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к перметрину и вспомогательным веществам лекарственного средства. Нарушения целостности кожи, воспалительные процессы и вторичные инфекции кожи. Беременность, кормление грудью. Не рекомендуется применение лекарственного средства больным бронхиальной астмой, обструктивным бронхитом, в том числе в анамнезе, в связи с риском возникновения бронхоспазма при вдыхании лекарственного средства. Детский возраст до 3 лет.

### **Передозировка**

При передозировке возможно усиление симптомов, указанных в разделе «Побочные эффекты». При передозировке необходимо прекратить применение средства, промыть кожу большим количеством теплой воды, также возможно применение антигистаминных средств. В случае отравления через вдыхание паров средства лечение необходимо начинать с выведения пациента на свежий воздух. Если средство попало в глаза или на кожу, пораженные участки необходимо промыть достаточным количеством воды.

При случайном применении средства внутрь большая вероятность спонтанной рвоты, поэтому дальнейший прием рвотных средств не рекомендуется в связи с риском быстрого развития судорог и комы. Всасыванию лекарственного средства можно помешать, промыв желудок и приняв активированный уголь или слабительное средство. Лечение прежде всего поддерживающее и включает наблюдение за пациентом на предмет проявления аллергических реакций.

### **Меры предосторожности**

Медперсонал, работающий с лекарственным средством, должен пользоваться защитными перчатками. Лекарственное средство следует применять только наружно. Лекарственное средство содержит бензалкония хлорид, который вызывает раздражение и может вызвать кожные реакции.

Обработку проводят в хорошо проветриваемом помещении или на улице. При обработке следует избегать попадания спрея на слизистые оболочки глаз, носа, ротовой полости, мочеполовых органов. В случае нечаянного попадания лекарственного средства на слизистые оболочки последние следует промыть большим количеством воды. После обработки нужно тщательно вымыть руки с мылом и прополоскать рот проточной водой.

Для предупреждения повторного заражения всю семью необходимо проверить на наличие возбудителей; обработать волосы тем лицам, которые контактировали с больным; продезинфицировать одежду, головные уборы, шарфы, постельное белье, расчески и т.д. Обработку следует проводить только в том случае, если были обнаружены гниды или живые вши.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Не установлено

**Применение в период беременности и кормления грудью**

Безопасность применения при беременности и в период лактации не доказана. В качестве меры предосторожности не следует использовать лекарственное средство беременным или кормящим грудью женщинам.

**Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами**

Данные о влиянии на способность управлять автомобилем и работать с механизмами отсутствуют.

**Упаковка**

По 50 г в баллоне алюминиевом с клапаном насосного типа. Баллоны обеспечены распылителем и защитным колпачком.

Каждый баллон с распылителем, защитным колпачком и листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

**Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

3 года. Препарат не должен применяться по истечении срока годности.

**Условия отпуска**

Без рецепта врача.

**Информация о производителе (заявителе)**

***Произведено и расфасовано (заявитель)***

АО «Стома», Украина  
61105 г. Харьков, ул. Ньютона, 3

***Упаковано***

ООО «БЕЛАЛЕК», Республика Беларусь  
222163 г. Жодино, ул. Советская, 9

тел.: +375447777701

e-mail: [belalek@tut.by](mailto:belalek@tut.by)